

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Belchim Crop Protection Hungary Kft** (1124 Budapest, Jagelló út 14.) által képviselt **BI-PA NV.**, (Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, Belgium) ügyfél kérelmére a **Vintec gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a **Vintec gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 6300/2876-1/2020 **NÉBIH** számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

I. *Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

6.1. A kiszerelés mennyisége:	50 g, 100 g, 200 g, 2 kg
6.2. A csomagolószert anyaga:	PE/Al/PE tasak

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános”

Budapest, 2021. augusztus 31.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(439/2021.)

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
				szer	víz	
Szőlő oltványiskola	Korai tőkepusztulás kórokozói (<i>Phaeomoniella chlamydospora</i> , <i>Phaeoacremonium minimum</i>)	4	-	200 g /100 l víz	-	oltvány állapot
Szőlő (bor és csemege)	Korai tőkepusztulás kórokozói (<i>Phaeomoniella chlamydospora</i> , <i>Phaeoacremonium minimum</i> , <i>Eutypa lata</i>)	2	7	200 g/ha	100-200 l/ha	nyugalmi időszakban a metszést követően (BBCH 00)
Paradicsom (hajtatás)	Szürkepenész	8	5	5-10 g/100 l víz max 150 g/ha	500-1500 l/ha	elsődleges oldalhajtások megjelenésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Előírt növényvédelmi technológia:

Szőlő oltvány iskolában a biológiai készítményt az oltvány előállításakor három fázisban javasolt felhasználni 0,2 kg/100 l víz töménységben, amely 3000 oltvány kezelésére elegendő.

Első kezelés: az alany és oltóvesszők (oltócsapok) kitérés utáni, oltás előtti előáztatásos felületkezelése. (A kezelés időtartama 5-12 óra a hűtőtárolás körülményeinek figyelembevételével pl. nejlonszakos hűtőtárolás esetén rövidebb áztatási idő is elegendő.)

Második kezelés: előhajtáskor az elkészített oltványok betárolása után a hajtató közeg beöntözése.

Harmadik kezelés: közvetlenül kiiskolázás előtt a talpi rész, gyökérszövet 10 percig tartó beáztatása a sérült gyökerek védelmére.

Szőlő ültetvényben a készítményt a nyugalmi időszakban, a metszést követő napokban akkor kell kijuttatni, amikor a hőmérséklet legalább 5 órán keresztül meghaladja a 10 °C-t, illetve a relatív páratartalom a 70%-ot. Az optimális hatás eléréséhez a kezelést követő 24 órán belül eső és fagy nem fordulhat elő. A készítményt 0,2 kg/ha dózisban, hektáronként 100-200 l vízmennyiség felhasználásával a metszési sebek felületére kell permetezni, vagy fecskendezni. A metszési sebek tökéletes befedése érdekében a permetezést a szőlősor mindkét oldalán el kell végezni.

A készítménnyel végzett kezelés mellett a szőlő művelése során fokozottan ügyelni kell az egyéb megelőző eljárások végrehajtására (pl.: kései metszés, elhalt, illetve megbetegedett fás növénymaradványok eltávolítása a területről és annak közvetlen környezetéből).

Hajtatott paradicsomban szürkepenész ellen a készítményt 5-10 g/100l víz töménységben **megelőző jelleggel** szükséges kijuttatni az elsődleges oldalhajtások megjelenésétől. A fertőzési veszélyhelyzet fennállásáig a kezeléseket javasolt 5-10 naponként megismételni, törekedve az egyenletes permetléfedettség biztosítására, különösen a fitotechnikai munkálatok során ejtett sebzési felületeken.

A Vintec tankkeverékben más növényvédő szerekkel együtt nem juttatható ki, továbbá kerülni kell a gombaölő szerek Vintec-kel végzett kezelésekhez viszonyított túl közeli időpontban történő kijuttatását is.

Hatásmechanizmus:

A *Trichoderma atroviride* SC1 több hatáshelyen ható mikroorganizmus (FRAC kód: BM02)

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. Veszélyjelek, osztályozás

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg (4.1 × 10⁸ CFU/állat)

Vízi szervezetekre való veszélyesség: *nem jelölésköteles*

Méhveszélyesség: *nem jelölésköteles*

Méhveszélyesség toxicitás alapján:* *nem jelölésköteles*

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:* *nem jelölésköteles*

Tűzveszélyességi besorolás: *nem jelölésköteles*

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram



Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

H351 Feltehetően rákot okoz.

* Címkén nem feltüntetendő adat

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

- P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/csomagolóeszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Trichoderma atroviride-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Immunhiányos és immunszuppresszív anyagokkal végzett kezelésben részesülő személyek a készítményt nem használhatják.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH212** Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. Ezt a port nem szabad belélegezni.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

5.4. várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
szőlő	előírászerű felhasználás esetén nem szükséges
paradicsom	előírászerű felhasználás esetén nem szükséges

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.5.1. Egyéni védőfelszerelés**

5.5.1.1. *Előkészítőknak:* védőkesztyű, FFP3 jelű részecskeszűrő félálarc

5.5.1.2. *Kijuttatóknak:* védőkesztyű, FFP3 jelű részecskeszűrő félálarc (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel, itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. A növényvédő szer kiserelése, csomagolása:

6.1. A kiserelés mennyisége:	50 g, 100 g, 200 g, 2 kg
6.2. A csomagolószer anyaga:	PE/Al/PE tasak

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, szabályos növényvédő szer raktárban 4 °C-on: **2 év**,
20 °C-on: 6 hónap.

8. Forgalmazási kategória: II.

Budapest, 2021. augusztus 31.

Jordán László
igazgató

P.H.